

Quand consulter aux urgences pédiatriques ?



LA FIÈVRE SE MESURE

Il y a fièvre lorsque la température corporelle dépasse 38°. Préférer un thermomètre rectal ou auriculaire. Une fièvre élevée n'est pas forcément un critère de gravité.



EN CAS DE FIÈVRE

- Découvrir l'enfant : ni couverture ni vêtements chauds,
- si $t^{\circ} > 38.5^{\circ}$: donner du paracétamol,
- surveiller l'enfant dans la demie-heure qui suit :

Les signes à surveiller

LA COLORATION



- Pâleur inhabituelle
- Lèvres, doigts ou mains devenant bleus

LE COMPORTEMENT



- Pas ou peu d'interaction/réaction
- Comportement amorphe

LA RESPIRATION



- Respiration rapide, difficile
- Creux sous les côtes/dans le cou

Les troubles du CCR doivent amener à consulter aux urgences pédiatriques



L'ALIMENTATION



- Jusqu'à 18 mois,
- mange moins de la moitié de son repas sur plusieurs biberons d'affilé,
- fièvre $> 38^{\circ}$



LES ÉRUPTIONS CUTANÉES



- Fièvre $> 38^{\circ}$
- éruption cutanée qui reste rouge violacée en passant le doigt ou un verre dessus, et qui peut s'étendre rapidement



Selon l'âge de l'enfant

< 3 MOIS

- Chez le tout petit, une fièvre $> 38^{\circ}$ est toujours un motif de consultation aux urgences



< 3 ANS

- Dégradation de l'état général
- fièvre $> 38^{\circ}$ sans explication (rhume, gastro)
- pendant + de 3 jours
- absence de troubles du CCR :

Consultation médicale

> 3 ANS

- Dégradation de l'état général
- fièvre $> 38^{\circ}$ sans explication (rhume, gastro)
- pendant + de 5 jours
- absence de troubles du CCR :

Consultation médicale

Ces informations ne concernent pas les enfants atteints de pathologies particulières.